Accueil > Astronomie > Exploration du système solaire

De l'Arctique à l'Antarctique : quand les pôles opposés s'attirent

Un scientifique a récemment mené des opérations de forage dans l'Arctique. L'altruisme de cet événement individuel ? Bénéficier à tous les océans et surtout se mettre en route de manière pour nous étudier et protéger ces zones particulièrement fragiles.

Publié le 19 décembre 2022 à 11h00

Partager
Facebook
Twitter
Linkedin
Email

Vue d'artiste de l'océan Austral, dans l'hémisphère Sud, entre l'Antarctique et le continent australien.

Auteur
Lydia Flamglise
Lydia Flamglise est diplômée de l'école supérieure de journalisme de Lille. Elle a travaillé pour Science & Vie, Ouest-France, Pour la Science, Le Monde, Le Figaro Magazine, Le Point, Le Parisien, Libération, La Recherche et Télérama. Elle est aujourd'hui rédactrice en chef adjointe de Pour la Science.
Suivre l'auteur

Le 19 octobre
Un scientifique belge
Dans
Le Monde antarctique
Le magazine
Le supplément des passionnés
Le 19 décembre
Un scientifique belge
Dans
Le Monde antarctique
Le magazine
Le supplément des passionnés

En kiosque
Pour la Science
N°
LES GRANDES
INTELLIGENCES
ARTIFICIELLES
Abonnez-vous et recevez
1 plus de 20 ans d'archives
Découvrez
Abonnez-vous
N°??? de 2023
Découvrez
Abonnez-vous
Newsletters
Restez informé de toutes les actualités
Je m'inscris
Les sur Science
Une navigation de Faraday : histoire d'une découverte
Sciences sociales
Économie et Sciences, 3 Petits Scalpels Sur Cinq
Sciences sociales
Les mêlées cassent les dilutions utilisant des chiffres flous
Sciences sociales
Physique quantique : les atomes sautent des croissants !
Sciences sociales
Mais qu'est-ce qu'Alexandrie 3D 2022 est-il ? Le point sur les jeux dans les universités français !

Vue depuis le continent Antarctique (à droite) jusqu'à l'île Adélie (à gauche) de l'océan Austral, entre l'Antarctique et l'Australie.

Les deux pôles réunis

Centre des deux pôles sont particulièrement connectés, se Robert Calcagno, directeur de l'institut océanographique de Nouvelle-Zélande à Wellington. « Ce sont tous les deux des réservoirs de froid, explique-t-il. Ils contiennent, à la surface, les mêmes concentrations de gaz à effet de serre, et ils sont tous les deux recouverts de glace de mer. Ils sont aussi tous les deux entourés d'océan. Et ce sont les seuls endroits où l'océan est en contact avec l'atmosphère. » Et ce n'est pas tout. Tous les deux sont le théâtre d'une circulation océanique particulière, qui relie les océans Pacifique, Indien et Atlantique. Ainsi, ils sont tous les deux connectés au reste de la planète.

Circulation des courants marins à la surface de la Terre. Les courants chauds sont représentés en rouge, et les courants froids en bleu.

Pour autant, ces deux pôles ne sont pas identiques. Ils sont même très différents. Le premier, l'Arctique, est entouré de terres. Il est recouvert d'une banquise pérenne, c'est-à-dire qui ne fond pas totalement chaque année. Le second, l'Antarctique, est un continent recouvert d'une calotte glaciaire. Il est entouré d'océan. Et il est recouvert d'une banquise saisonnière, qui fond et se reforme chaque année. Ces différences font que les deux pôles réagissent différemment aux changements climatiques.

Comparaison de la quantité de glace de mer présente dans l'océan Arctique (à gauche) et dans l'océan Austral (à droite) en 2012.

Le glacier de l'Apocalypse

Et les deux océans connaissent le phénomène bien documenté du réchauffement. Mais, là encore, les différences existent. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.



Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Ces différences s'expliquent par la nature même des océans. Dans l'océan Austral, les courants circulent d'ouest en est autour du continent. Ils sont donc peu influencés par les terres. Dans l'océan Arctique, au contraire, les courants sont bloqués par les terres qui l'entourent. Ils ont donc du mal à se renouveler. Ils sont plus stables. Et ils sont plus sensibles aux apports d'eau douce provenant des fleuves et des glaciers.



Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Ces différences ont des conséquences sur la fonte des glaces. Dans l'océan Austral, elle est plus rapide que dans l'océan Arctique. Et elle est plus rapide que prévu. Ainsi, le glacier Thwaites, situé sur la mer d'Amundsen en Antarctique de l'Ouest, a perdu 600 milliards de tonnes de glace par an entre 2011 et 2017. Soit presque deux fois plus que ce que prévoyaient les modèles climatiques. Et ce glacier est particulièrement inquiétant. Il contient à lui seul assez de glace pour faire monter le niveau de la mer de 65 centimètres. Et il est instable. Il pourrait donc s'effondrer rapidement, libérant toute cette glace dans l'océan. Ce qui pourrait faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres en quelques décennies.



Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Le glacier Thwaites est surnommé le glacier de l'Apocalypse. Et il mérite bien son nom. Car, si son effondrement est inévitable, il pourrait prendre des siècles. Voire des millénaires. Mais il pourrait aussi déclencher celui d'autres glaciers, plus petits, mais plus nombreux. Et ceux-là pourraient s'effondrer plus rapidement. Ainsi, le glacier Pine Island, situé à côté du glacier Thwaites, pourrait à lui seul faire monter le niveau de la mer de 1,5 mètre. Et il pourrait s'effondrer d'ici à 2100.



Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Plus encore, rappelle la spécialiste, l'Antarctique n'est pas le seul glacier préoccupant dans la région. Il y a aussi le glacier Totten, situé à l'est de la mer de Somov, qui contient à lui seul assez de glace pour faire monter le niveau de la mer de 3,5 mètres. Et il y a aussi le glacier Denman, qui fait 1 500 mètres d'épaisseur et qui contient à lui seul assez de glace pour faire monter le niveau de la mer de 1,5 mètre. Et il y a aussi le glacier Pine Island, situé à côté du glacier Thwaites, qui pourrait à lui seul faire monter le niveau de la mer de 1,5 mètre. Et il y a aussi le glacier Pine Island, situé à côté du glacier Thwaites, qui pourrait à lui seul faire monter le niveau de la mer de 1,5 mètre.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Le problème de la glace de mer

Pourtant, la perte accélérée de la glace de mer est bien présente dans l'océan Austral. Et elle est même particulièrement inquiétante. Car, contrairement à ce qu'il se passe dans l'océan Arctique, la glace de mer de l'océan Austral est très peu épaisse. Elle ne fait que quelques mètres d'épaisseur. Et elle est très fragile. Elle est donc très sensible aux changements climatiques. Et elle est très sensible aux changements climatiques. Et elle est très sensible aux changements climatiques. Et elle est très sensible aux changements climatiques.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Une question de pompe

Et plus grave encore, la perte accélérée de la glace de mer pourrait avoir des conséquences sur la circulation océanique. Et sur le climat. Car, en fondant, la glace de mer libère de l'eau douce. Et cette eau douce est plus légère que l'eau salée. Elle forme donc une couche de surface qui empêche l'eau salée de remonter. Et cette eau salée est plus dense. Elle coule donc. Et elle entraîne avec elle le carbone qu'elle contient. Et ce carbone est ensuite stocké au fond des océans. Et ce carbone est ensuite stocké au fond des océans. Et ce carbone est ensuite stocké au fond des océans.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Une « Mare Incognita »

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

« Un prince bipolaire »

Robert Calcagno l'a appelé, le prince Albert 1er d'Antarctique. Et l'histoire océanographique de Monaco, et de son souverain, est effectivement étroitement liée à celle des pôles. Albert 1er, prince de Monaco de 1889 à 1922, a mené à bord de son navire scientifique, la Princesse Alice, plusieurs campagnes océanographiques dans l'Arctique et en Antarctique de 1898 à 1910. Et il a ramené de ses expéditions des milliers d'échantillons de roches, de sédiments et d'animaux marins. Et il a fait don de plusieurs de ces objets à la France. Et il a fait don de plusieurs de ces objets à la France. Et il a fait don de plusieurs de ces objets à la France.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

Le bateau brise-glace Nathaniel B. Palmer dans la mer d'Amundsen, en Antarctique, en février 2019.

Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, la température de surface de l'eau a augmenté de 0,17 °C par décennie entre 1982 et 2017. Dans l'océan Arctique, elle a augmenté de 0,94 °C par décennie sur la même période. Soit presque six fois plus vite. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique. Et ce n'est pas tout. Dans l'océan Austral, le réchauffement s'est étendu à plus de 1 000 mètres de profondeur, alors qu'il est resté en surface dans l'océan Arctique.

directrice du Centre pour la nature et le climat du Forum économique mondial, porte-voix du secteur privé et des très grandes multinationales.

Une recherche polarisée

Autre engagement monégasque en faveur des pôles, le laboratoire de biologie polaire – depuis devenu le département de biologie polaire – a été créé au Centre scientifique de Monaco dans le cadre d'un partenariat signé avec le CNRS en 2010 peu après que la principauté a adhéré au traité sur l'Antarctique et au SCAR. On lui doit quelques avancées récentes notamment sur les oiseaux marins au travers des observatoires mis en place avec l'aide logistique de l'Ipev et de l'Institut polaire allemand. Céline Le Bohec en décrit les objectifs : « Il s'agit d'évaluer les capacités d'adaptation des populations d'oiseaux marins suivies face au changement très rapide du climat, de modéliser leur devenir en fonction des scénarios élaborés par les climatologues et les océanographes et finalement de fournir des outils utiles à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité polaire. »

Le manchot royal, une espèce menacée par le réchauffement climatique.

© H. Krivault (IPEV/CNRS/ESCMI)

Ainsi, dans le cas des manchots royaux *Aptenodytes patagonicus*, dont deux populations sont suivies sur le long terme à Crozet et Kerguelen, l'équipe a montré qu'une augmentation de 0,5 °C de la température des eaux de surface où les oiseaux s'alimentent en hiver entraîne une diminution d'environ 10 % de la survie des adultes, seulement 0,3 °C ! Plus récemment, grâce à l'analyse de données massives en séquençage génomique, combinées à des modèles démographiques, de niche écologique et climatiques, les résultats du CSM ont révélé qu'environ 70 % de la population mondiale de manchots royaux pourrait bien disparaître d'ici la fin du siècle si aucune mesure n'était prise pour endiguer le réchauffement climatique de façon immédiate et drastique.

Concernant les manchots empereurs *Aptenodytes forsteri*, le CSM a mis en évidence la vulnérabilité des colonies, et particulièrement le manque de protection des juvéniles lors de leur premier période d'une année en mer, et œuvre à changer le statut de l'espèce, aujourd'hui considérée par l'UICN comme « quasi menacée ».

Dernier volet abordé lors du symposium, la transmission des connaissances vers le grand public est essentielle. Ainsi, le rapport du Giec souligne l'importance de l'éducation pour agir grâce à l'amélioration les connaissances sur le changement climatique, sur les océans et sur la cryosphère. C'est la mission de l'Institut océanographique de Monaco, qui se déploie en plusieurs volets. Le premier est la parution d'un livre, *Au cœur des mondes polaires, entre réchauffement et convoitises*, publié aux éditions Glénat et réunissant les contributions de dizaines d'experts.



© Glénat/Institut océanographique de Monaco

Second volet, le 4 juin 2022 sera inaugurée l'exposition « Mission polaire », où les visiteurs seront invités à s'immerger dans les zones polaires pour mieux en comprendre les enjeux scientifiques, environnementaux, humains… « Immerger » est le mot, car dans une salle de projection immersive les spectateurs ressentiront au plus près cet environnement extraordinaire. Dans l'exposition, on verra également la collection d'objets scientifiques, graphiques et artistiques que Jean Malaurie a récemment léguée à l'Établissement. Ce sera l'occasion de fêter le centenaire de l'explorateur et ethnologue spécialiste de l'Arctique.

À l'heure où la France souhaite le lancement d'une « Décennie des mondes polaires », de 2025 à 2035, pour soutenir la recherche scientifique internationale, il est temps pour chacun de découvrir les pôles et de comprendre leur richesse et leur fragilité.

Aire protégée | Aires marines protégées | Antarctique | Apocalypse | Arctique | Banquise | Glace de mer | Groenland | Élévation du niveau des mers | Océanographie | Océans | Permafrost | Pole sud | Pôles | Réchauffement climatique | Ross | Spitzberg | Svalbard | Tara oceans

Sur le même sujet

Océanographie · 23min · 21/11/2022
Pourquoi la glace de mer en Antarctique résiste au réchauffement
Les modèles qui simulent les tourbillons océaniques au large de l'Antarctique permettent de comprendre l'étonnante stabilité de la glace de mer de l'océan austral face au changement climatique.

Climatologie · 23min · 21/11/2022
La contribution de la fonte des glaces au réchauffement climatique estimée
On savait que la fonte des glaces, entraînée par le réchauffement climatique, contribue en retour à ce dernier. On a maintenant estimé de combien : sur le long terme, ce cercle vicieux contribuerait de 0,43 °C à l'augmentation de la température moyenne globale.

Art & science · 23min · 15/03/2020
La mer… qu'on voit monter
Comment se représenter la hausse du niveau des mers ? Deux artistes finlandais ont une solution : des lignes de LED.

Climatologie · 23min · 07/02/2019
Climat: le rôle modérateur des océans s'amenuise
Hausse du niveau de la mer, réchauffement, acidification, fonte des glaciers… Le dernier rapport spécial du Giec dresse un panorama de l'évolution des océans et de la cryosphère dans le contexte du réchauffement climatique.

Climatologie · 19min · 01/12/2015
La pêche à la crêpe de glace
Lors d'une expédition dans l'océan Antarctique, des chercheurs sont partis « pêcher » des crêpes de glace. Leur objectif : mesurer leurs propriétés pour les intégrer de façon plus réaliste dans les modèles climatiques.

Climatologie · 23min · 31/01/2017
La grande débâcle de l'Arctique
La banquise de l'océan Arctique fond à des vitesses record, et elle pourrait disparaître en été dès 2040. Or les glaces boréales contribuent à la stabilité du climat de tout l'hémisphère Nord. Sans elles, les épisodes climatiques extrêmes qui frappent l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie risquent donc de s'intensifier.

Les plus lus

Technologie · 12min · 01/03/2022
Les promesses exagérées des missiles hypersoniques

Physique · 12min · 01/03/2022
« Le défi ITER était hors norme, mais nous touchons au but »



Histoire des sciences · 12min · 01/03/2022
Gaïa : enquête sur une révolution silencieuse

Nos dernières parutions



N°535 MAI 2022
Mathématiques : l'humain bientôt dépassé par les machines ?

N°143 MAI 2022
Les 3000 premiers jours

N°515 MAI 2022
Jusqu'où ira l'intelligence artificielle ?

N°29 AVRIL 2022
Le multivers

Newsletters Restez informé de toutes nos actualités ! Je m'inscris

À la Une



Mathématiques · 29min
Les mathématiciens face au défi des machines

Matériaux · 9min
Des boîtes quantiques pour doper les panneaux solaires

Environnement · 12min
Veux-on d'une Terre jardin ?

Abonnez-vous et accédez à plus de 20 ans d'archives !

Offre numérique
12 numéros + 4 hors-série
en version numérique
+ Accès illimité à plus de 20 ans d'archives
Je m'abonne

Offre intégrale
12 numéros + 4 hors-série
en version papier + numérique
+ Accès illimité à plus de 20 ans d'archives
Je m'abonne

Newsletters
Restez informés de toutes nos parutions et découvrez des articles gratuits chaque semaine !
Je m'inscris

Pour la Science
170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS CE
N° CPPAP : 0322 W 91126